

CH XXII : Espaces vectoriels

I. Structure vectorielle**I.1. Définition****Définition**

Soit E un ensemble non vide.

- Une **loi de composition interne** \top sur l'ensemble E est une application $\top : E \times E \rightarrow E$. Autrement dit : $\forall (x, y) \in E^2, x \top y \in E$.
- Une **loi de composition externe** $*$ sur l'ensemble E est une application $*$: $\mathbb{R} \times E \rightarrow E$. Autrement dit : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \lambda * x \in E$.

Exemple

Notons $E = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

- Cet ensemble possède une loi de composition interne (noté $+$) :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Cet ensemble possède une loi de composition interne (noté \cdot) :

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Définition

Un ensemble non vide E est un espace vectoriel sur \mathbb{R} si :

1) E est muni d'une loi $+$ qui vérifie les propriétés suivantes.

a) $+$ est une loi de composition interne

b) $\forall(x, y) \in E^2, x + y = y + x$ (*commutativité*)

c) $\forall(x, y, z) \in E^2, x + (y + z) = (x + y) + z$ (*associativité*)

d) $\exists 0_E \in E$ tel que : $\forall x \in E, x + 0_E = 0_E + x = x$ (*élément neutre*)

e) $\forall x \in E, \exists y \in E, x + y = y + x = 0_E$ (*y opposé de x*)

2) E est muni d'une loi \cdot qui vérifie les propriétés suivantes.

a) \cdot est une loi de composition externe

b) $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall(x, y) \in E^2, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$

c) $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall(x, y) \in E^2, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$

d) $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E, (\lambda\mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$

e) $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E, 1 \cdot x = x$

Vocabulaire

Soit E un espace vectoriel sur \mathbb{R} .

- On parle aussi de \mathbb{R} -espace vectoriel. À notre niveau, on pourra même omettre le \mathbb{R} et parler simplement d'espace vectoriel.
- Les éléments de E sont appelés vecteurs.
- Afin de faire la différence entre réels et vecteurs on note souvent les vecteurs à l'aide d'une flèche : \vec{x} .
- L'élément neutre $0_{\vec{E}}$ de E est unique.
On pourra le noter simplement 0 s'il n'y a pas ambiguïté.
- Si $\vec{x} \in E$, l'opposé de \vec{x} par $+$ est unique et est noté $-\vec{x}$.

Exemple

- \mathbb{R} est un \mathbb{R} -espace vectoriel.
- $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel puisque les lois $+$ et \cdot citées précédemment vérifient les propriétés de la définition.

Remarque

- L'ordre des éléments dans la multiplication externe est important :

$$\cancel{\vec{x}} \cdot \lambda \quad \lambda \cdot \vec{x} \quad \checkmark$$

- La définition d'ev ne fait pas apparaître de loi permettant la multiplication de vecteurs. On ne peut donc, a priori, multiplier deux vecteurs entre eux.

$$\cancel{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}} \times \cancel{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}}$$

Proposition 1.

Soit E un espace vectoriel.

Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et soit $(\vec{x}, \vec{y}) \in E^2$.

- $\lambda \cdot \vec{0}_E = \vec{0}_E$
- $0 \cdot \vec{x} = \vec{0}_E$
- $\lambda \cdot (-\vec{x}) = (-\lambda) \cdot \vec{x} = -(\lambda \cdot \vec{x})$
- $\lambda \cdot \vec{x} = \vec{0}_E \Rightarrow \lambda = 0 \quad \text{OU} \quad \vec{x} = \vec{0}_E$

Démonstration.

- $\lambda \cdot \vec{0}_E = \lambda \cdot (\vec{0}_E + \vec{0}_E) = \lambda \cdot \vec{0}_E + \lambda \cdot \vec{0}_E$. On ajoute alors \vec{u} l'opposé de $\lambda \vec{0}_E$ de part et d'autre de l'égalité :

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \vec{0}_E + \vec{u} &= \lambda \cdot \vec{0}_E + \lambda \cdot \vec{0}_E + \vec{u} \\ \vec{0}_E &= \lambda \cdot \vec{0}_E + \vec{0}_E = \lambda \cdot \vec{0}_E \end{aligned}$$

- De même, on remarque $0 \cdot \vec{x} = (0+0) \cdot \vec{x} = 0 \cdot \vec{x} + 0 \cdot \vec{x}$ et on ajoute l'opposé de $0 \cdot \vec{x}$ de chaque côté.

- c) $\vec{0}_E = \lambda \cdot \vec{0}_E = \lambda \cdot (\vec{x} + (-\vec{x})) = \lambda \cdot \vec{x} + \lambda \cdot (-\vec{x})$ et on ajoute l'opposé de $\lambda \cdot \vec{x}$ de chaque côté.
De même, $\vec{0} = O \cdot \vec{x} = (\lambda + (-\lambda)) \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x} + (-\lambda) \vec{x}$.
- d) Supposons $\lambda \cdot \vec{x} = \vec{0}_E$ et $\lambda \neq 0$. On aura alors : $\frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot \vec{x}) = \frac{1}{\lambda} \cdot \vec{0}_E = \vec{0}_E$ d'où $1 \cdot \vec{x} = \vec{0}_E$ et $\vec{x} = \vec{0}_E$. \square

Illustration sur un exemple.

Pour comprendre plus facilement ce que représentent ces propriétés, traduisons-les sur l'exemple simple de $E = \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Notons tout d'abord que : $\vec{0}_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- a) $\lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- b) $0 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- c) $\lambda \cdot \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ -x_3 \end{pmatrix} = (-\lambda) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = - \left(\lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$
- d) $\lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 0$ OU $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Définition

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel et $m \in \mathbb{N}^*$.

Soit $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$ une famille de vecteurs de E .

- Un vecteur $\vec{v} \in E$ est une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m$ s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$ tel que

$$\vec{v} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m$$

Remarque

On a déjà utilisé cette propriété sans la citer. En effet, si l'on considère de nouveau l'application linéaire f :

$$f : \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ x + 2y + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Alors $\text{Im } f$ s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \left\{ x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{Vect} \left(f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right) \end{aligned}$$

III.4. Conclusion : montrer qu'un ensemble F est un ev

Nous pouvons maintenant compléter notre liste de méthodes permettant de montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel.

- 1) Revenir à la définition et vérifier tous les axiomes.
Long et pénible – à éviter.
- 2) Montrer que F est un sous-espace vectoriel F d'un ev E .
Méthode classique (fonctionne toujours !) à connaître absolument.
- 3) Montrer que F s'écrit sous la forme : $F = \text{Vect}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m)$.
Plus élégant et rapide.
- 4) Montrer que F s'écrit sous la forme : $F = \text{Ker } f$ où f est une application linéaire.
Plus élégant et rapide.
- 5) Montrer que F s'écrit sous la forme : $F = \text{Im } f$ où f est une application linéaire.
Tout aussi élégant et rapide.

On peut écrire cette image comme espace vectoriel engendré par une partie.

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \left\{ x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Théorème 6.

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$f \text{ surjective} \Leftrightarrow \text{Im } f = F$$

Démonstration.

On ne fait que rappeler ici le résultat obtenu dans le chapitre Ensembles et applications. \square

Remarque

Évidemment, dans le cas où l'application linéaire f est à la fois injective et bijective, on dit que f est bijective. Une application linéaire est avant tout une application (tout court) et les résultats obtenus dans le chapitre *Ensembles et applications* s'appliquent aux applications linéaires.

Théorème 7.

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soit $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base de E .

Alors $\text{Im } f$ est le sous-espace vectoriel de F engendré par la famille $(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$.

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$$

Démonstration.

(\subseteq) Soit $\vec{y} \in \text{Im } f$. Alors il existe $\vec{x} \in E$ tel que $\vec{y} = f(\vec{x})$. Dans la

base \mathcal{B} , \vec{x} s'écrit : $\vec{x} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + \dots + x_n \cdot \vec{e}_n$

On a donc : $f(\vec{x}) = x_1 \cdot f(\vec{e}_1) + \dots + x_n \cdot f(\vec{e}_n)$.

Ainsi, $\vec{y} \in \text{Vect}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$

(\supseteq) Chacun des vecteurs $f(\vec{e}_i)$ est dans $\text{Im } f$, ce qui suffit à démontrer l'inclusion. \square

II. Sous-espaces vectoriels

II.1. Définition

Définition

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel muni des lois $+$ et \cdot .

Une partie non vide F de E est un **sous-espace vectoriel** de E si :

- $\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2, \vec{x} + \vec{y} \in F$ (F est stable pour la loi $+$)
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in F, \lambda \vec{x} \in F$ (F est stable pour la loi \cdot)

Propriété

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel.

$$F \text{ est un sev de } E \Rightarrow \vec{0}_E \in F$$

Remarque

On utilisera particulièrement la contraposée de cette propriété.

$$\vec{0}_E \notin F \Rightarrow F \text{ n'est pas un sev de } E$$

Notons $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid x + y + z = 1 \right\}$.

Alors F n'est pas un sev de E . En effet, $\vec{0}_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin F$.

Proposition 2 (Caractérisation des sev de E).

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel.

F est un sous-espace vectoriel de E :

$$\text{ssi } \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2, \lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{y} \in F$$

$$\text{ssi } \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2, \lambda \cdot \vec{x} + \vec{y} \in F$$

(F est stable par combinaison linéaire d'éléments de F)

Démonstration.

- 1) (\Rightarrow) Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{x}, \vec{y}) \in F^2$. Comme F est stable par la loi $+$, on a $\lambda \cdot \vec{x} \in F$ et $\mu \cdot \vec{y} \in F$. Comme F est stable par la loi $+$, on a $\lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{y} \in F$.
- (\Leftarrow) La propriété étant vraie pour tout couple (λ, μ) elle l'est pour $\lambda = \mu = 1$, ce qui montre la stabilité de F par la loi $+$. En prenant seulement $\mu = 0$, on prouve que F est stable pour la loi \cdot .
- 2) Démonstration similaire. □

Proposition 3.

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel.

$$F \text{ sous-espace vectoriel de } E \Rightarrow F \text{ est un espace vectoriel}$$

Démonstration.
 + est une loi de composition interne pour F (par stabilité).
 + est une loi de composition externe pour F (par stabilité).
 De plus, ces deux lois vérifient les axiomes des espaces vectoriels puisqu'elles font déjà de E un espace vectoriel. □

Exemple

- Si E est un ev, $\{\vec{0}_E\}$ et E sont des sev de E .
- L'ensemble des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} , noté $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, est un \mathbb{R} -espace vectoriel (pour le démontrer : montrer que tous les axiomes sont vérifiés).

L'ensemble des fonctions réelles bornées / polynômes / paires sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et sont donc eux-mêmes des espaces vectoriels.

- $\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \right\}$ est un sev de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

III.3. Image d'une application linéaire

Définition

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle **image de f** et on note $\text{Im } f$ l'ensemble :

$$\text{Im } f = \{ \vec{y} \in F \mid \exists \vec{x} \in E, y = f(\vec{x}) \}$$

Théorème 5.

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Démonstration.

- $\text{Im } f \subseteq F$ (évident) et $\text{Im } f \neq \emptyset : f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$ donc $\vec{0}_F \in \text{Im } f$.
- Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(\vec{y}_1, \vec{y}_2) \in (\text{Im } f)^2$, alors il existe $(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \in E^2$ tel que $y_1 = f(\vec{x}_1)$ et $y_2 = f(\vec{x}_2)$. Alors $\vec{y}_1 + \lambda \cdot \vec{y}_2 \in \text{Im } f$ car : $\vec{y}_1 + \lambda \cdot \vec{y}_2 = f(\vec{x}_1) + \lambda \cdot f(\vec{x}_2) = f(\vec{x}_1 + \lambda \cdot \vec{x}_2)$. □

Exemple

Reprenons l'exemple fondamental.

- Soit $M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $f : \begin{matrix} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ X \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ MX \end{matrix}$.

Alors $\text{Im } f = \{ Y \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), Y = MX \}$. Ainsi, $\text{Im } f$ est l'ensemble des seconds membres Y tels que le système $MX = Y$ admet une solution.

- Il faut savoir reconnaître les ensembles écrits comme des images.

Par exemple, $F = \left\{ \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ x + 2y + z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}) \mid \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \right\} =$

$\text{Im } f$ où l'application linéaire f est définie par :

$$f : \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ x + 2y + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

On peut écrire ce noyau comme espace vectoriel engendré par une partie.

$$\text{Ker } f = \left\{ \begin{pmatrix} 2y \\ y \\ -y \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

- L'ensemble $F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \right\}$ est un ev.

En effet, c'est le noyau de l'application linéaire

$$f : \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto 3x_1 + 2x_2 - x_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

On peut écrire ce noyau comme espace vectoriel engendré par une partie.

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \right\} \\ = \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Théorème 4.

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow \text{Ker } f = \{\vec{0}_E\}$$

Démonstration.

(\Rightarrow) Comme f linéaire, $f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$. Comme f est injective, s'il existe un autre vecteur $f(\vec{x})$ tel que $f(\vec{x}) = \vec{0}_F$, c'est que $\vec{x} = \vec{0}_E$.

(\Leftarrow) Soit $(\vec{x}, \vec{y}) \in E^2$ tel que $f(\vec{x}) = f(\vec{y})$. On a alors : $f(\vec{x}) - f(\vec{y}) = \vec{0}_F$, ce qui s'écrit $f(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0}_F$. Ainsi, $\vec{x} - \vec{y} \in \text{Ker } f$, d'où $\vec{x} - \vec{y} = \vec{0}_E$ et $\vec{x} = \vec{y}$. \square

Montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel

Afin de montrer que F est un ev, il existe deux grandes méthodes.

- 1) Vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel : plutôt long et pénible.
- 2) Montrer que F est en fait un sev d'un ev E : plus simple et rapide ! On doit alors démontrer que :

$$(i) F \subseteq E$$

(ii) $F \neq \emptyset$: on montre généralement que $\vec{0}_E \in F$

(iii) Si $(\vec{x}, \vec{y}) \in F^2$, $\vec{x} + \vec{y} \in F$

(iv) Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\vec{x} \in F$, $\lambda \cdot \vec{x} \in F$

Étant donnée la propriété précédente, les points (iii) et (iv) peuvent être remplacés par la propriété équivalente :

(iii) Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(\vec{x}, \vec{y}) \in F^2$, $\lambda \cdot \vec{x} + \vec{y} \in F$

Illustration sur un exemple (fondamental !)

- Montrer que $\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \right\}$ est un ev.
- Généralisation. Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$. On considère :

$$F = \left\{ X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \mid MX = 0 \right\}$$

Montrons que l'ensemble F est un sev de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ (et donc un ev).

(i) $F \subseteq E$.

(ii) F est non vide : en effet le vecteur nul de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est une solution du système $MX = 0$.

(iii) Si X_1 et X_2 sont deux solutions du système, alors $X_1 + X_2$ est aussi solution du système car $M(X_1 + X_2) = MX_1 + MX_2 = 0$.

(iv) Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ solution du système alors λX est une solution du système car $M(\lambda X) = \lambda MX = 0$.

II.2. Sous-espace vectoriel engendré par une partie

Définition

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel.

Soit A une partie non vide de E ($A \subseteq E$).

- On appelle **sous-espace vectoriel engendré par A** et on note $\text{Vect}(A)$ l'ensemble des vecteurs de E qui s'écrivent comme combinaison linéaire d'éléments de A . Autrement dit :

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i \vec{a}_i \mid p \in \mathbb{N}^*, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p, (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_p) \in A^p \right\}$$

- Si de plus, $A = \{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m\}$ (*i.e.* A fini),

$$\text{Vect}(A) = \text{Vect}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i \vec{a}_i \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m \right\}$$

(on note $\text{Vect}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m)$ en lieu et place de $\text{Vect}(\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m\})$)



On suppose seulement que A est une partie non vide de E .
En aucun cas on ne suppose que A est un espace vectoriel.

$\text{Vect}(A)$ est le vectorielisé de A . Partant d'une partie A , on lui ajoute tous les éléments lui permettant d'obtenir une structure vectorielle :

- pour tout $a \in A$, on ajoute tous les λa avec $\lambda \in \mathbb{R}$,
- une fois ces ajouts effectués, on ajoute toutes les sommes finies d'éléments de cette nouvelle partie.

En somme, partant de A , on ajoute toutes les combinaisons linéaires d'éléments de A . On obtient ainsi un espace vectoriel : c'est $\text{Vect}(A)$.

III.2. Noyau d'une application linéaire

Définition

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle **noyau de f** et on note $\text{Ker } f$ l'ensemble :

$$\text{Ker } f = \{ \vec{x} \in E \mid f(\vec{x}) = \vec{0}_F \}$$

Théorème 3.

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration.

- $\text{Ker } f \subseteq E$ (évident) et $\text{Ker } f \neq \emptyset$: $f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$ donc $\vec{0}_E \in \text{Ker } f$,
- Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(\vec{x}, \vec{y}) \in (\text{Ker } f)^2$, alors $\vec{x} + \lambda \cdot \vec{y} \in \text{Ker } f$ car :
 $f(\vec{x} + \lambda \cdot \vec{y}) = f(\vec{x}) + \lambda \cdot f(\vec{y}) = \vec{0}_F + \lambda \cdot \vec{0}_F = \vec{0}_F$.

□

Exemple

Reprenons l'exemple fondamental.

- Soit $M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $f : \begin{matrix} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ X \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ MX \end{matrix}$.

Alors $\text{Ker } f = \{ X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \mid MX = 0 \}$.

Ainsi, $\text{Ker } f$ est l'ensemble des solutions du système homogène $MX = 0$,
 (n inconnues et p équation)

- Il faut savoir reconnaître les ensembles représentant des noyaux.

Par exemple, $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid x = 2y \text{ et } z = -y \right\} = \text{Ker } f$

où l'application linéaire f est définie par :

$$f : \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x-2y \\ y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- Exemple fondamental. Si $M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, alors :

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{L'application } f \text{ définie par} \\ f : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto & MX \end{array} \end{array}} \text{ est linéaire.}$$

Théorème 2.

Soit n et p deux entiers naturels non nuls.

Toute application linéaire f de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ est de la forme :

$$\boxed{f : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto & MX \end{array}}$$

Démonstration.

Notons $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ la base canonique de $E = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Notons $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ la base canonique de $F = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Tout vecteur $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ se décompose de manière unique

$$\text{sur la base } \mathcal{B}_E : \quad X = x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + \dots + x_n \cdot \vec{e}_n$$

Par application de la fonction f , linéaire, on obtient :

$$f(X) = x_1 \cdot f(\vec{e}_1) + \dots + x_n \cdot f(\vec{e}_n)$$

Ainsi, $f(X)$ ne dépend que des valeurs des $f(\vec{e}_i)$: l'image de la fonction f est uniquement déterminée par la valeur de f sur les vecteurs \vec{e}_i . En fait, f peut s'écrire sous la forme matricielle $f : X \mapsto MX$ où M est la matrice obtenue en concaténant les vecteurs $f(\vec{e}_i)$.

$$M = \left(\begin{array}{c} f(\vec{e}_1) \\ \parallel \\ \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{p1} \end{pmatrix} \end{array} \right), \dots, \left(\begin{array}{c} f(\vec{e}_n) \\ \parallel \\ \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{pn} \end{pmatrix} \end{array} \right)$$

En effet, avec cette notation, on a : $M\vec{e}_i = f(\vec{e}_i)$. □

Propriété

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel.

Soit A une partie non vide de E ($A \subseteq E$).

- 1) $\vec{0}_E \in \text{Vect}(A)$.
- 2) $A \subseteq \text{Vect}(A)$.
- 3) $\text{Vect}(A)$ est le plus petit sev de E contenant A .
- 4) A est un ev $\Leftrightarrow A = \text{Vect}(A)$.
- 5) On a notamment : $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.
- 6) $A \subseteq B \Rightarrow \text{Vect}(A) \subseteq \text{Vect}(B)$.

Démonstration.

1) En prenant $p = 1$, $\lambda_1 = 0$, $\vec{a} \in A$, on obtient $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}_E \in \text{Vect}(A)$.

2) En prenant $p = 1$, $\lambda_1 = 1$, $\vec{a} \in A$, on obtient $1 \cdot \vec{a} = \vec{a} \in \text{Vect}(A)$.

3) $\text{Vect}(A)$ est bien un sev de E car c'est une partie non vide de E , stable par $+$ et \cdot . De plus, on remarque que tout sev de E qui contient A doit contenir toutes les combinaisons linéaires d'éléments de A (par définition d'ev) et doit donc contenir $\text{Vect}(A)$.

4) (\Rightarrow) Si A est un ev, alors A est le plus petit ev de A contenant A . Ainsi, $\text{Vect}(A) = A$.

(\Leftarrow) Si $A = \text{Vect}(A)$, comme $\text{Vect}(A)$ est un ev, alors A est un ev.

5) $\text{Vect}(A)$ est un ev donc $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.

6) Supposons $A \subseteq B$ et soit $\vec{x} \in \text{Vect}(A)$.

Alors $\vec{x} = \sum_{i=1}^p \lambda_i \vec{a}_i$ pour $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ et $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_p) \in A^p$.

Comme $A \subseteq B$, pour tout i on a $\vec{a}_i \in B$ et donc $\vec{x} \in \text{Vect}(B)$. □

Exemple

• Si $A = \{\vec{0}\}$, on a $\text{Vect}(A) = A = \{\vec{0}\}$.

• Si $A = \{\vec{a}\}$ avec $\vec{a} \neq \vec{0}$ alors $\text{Vect}(A) = \{\lambda \vec{a} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$.
On notera simplement $\text{Vect}(\vec{a})$ au lieu de $\text{Vect}(\{\vec{a}\})$.

• Si $A = \{\vec{a}, \vec{b}\}$ avec $\vec{a} \neq \vec{0}$ et $\vec{b} \neq \vec{0}$ alors on a :
 $\text{Vect}(A) = \{\lambda \vec{a} + \beta \vec{b} \mid (\lambda, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$.

On notera simplement $\text{Vect}(\vec{a}, \vec{b})$ au lieu de $\text{Vect}(\{\vec{a}, \vec{b}\})$.

• On a notamment :

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid x = 2y \text{ et } z = -y \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 2y \\ y \\ -y \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

• Et aussi :

$$\left\{ \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ x + 2y + z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \right\}$$

$$= \left\{ x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \mathbb{R}^2$$

Proposition 4.

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel.

Soit A une partie non vide de E ($A \subseteq E$).

1) Si $\vec{a} \neq \vec{0}_E$, on a $\text{Vect}(\vec{a}, \vec{0}_E) = \text{Vect}(\vec{a})$.

2) De manière générale, on a :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{u_{m+1}} \in \text{Vect}(\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_s}) &\Rightarrow \text{Vect}(\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_s}, \overrightarrow{u_{s+1}}) \\ &= \text{Vect}(\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_s}) \end{aligned}$$

3) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \text{Vect}(\overrightarrow{u_1}, \dots, \lambda \overrightarrow{u_i}, \dots, \overrightarrow{u_s}) = \text{Vect}(\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_i}, \dots, \overrightarrow{u_s})$

Propriété

Soient E et F deux espaces vectoriels.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire. Alors :

1) $f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$

2) $\forall \vec{x} \in E, f(-\vec{x}) = -f(\vec{x})$

3) $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n, \forall (\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in E^n,$

$$f(\lambda_1 \cdot \vec{x}_1 + \dots + \lambda_n \cdot \vec{x}_n) = \lambda_1 \cdot f(\vec{x}_1) + \dots + \lambda_n \cdot f(\vec{x}_n)$$

(compatibilité de f avec les combinaisons linéaires)

Remarque

Une application linéaire est donc à la fois convexe et concave.

Exemple

• L'application nulle de E dans F , définie par $f(\vec{x}) = \vec{0}_F$ pour tout $\vec{x} \in E$ est une application linéaire.

• L'application identité de E , définie par $f(\vec{x}) = \vec{x}$ pour tout $\vec{x} \in E$ est une application linéaire.

• Considérons $E = \mathbb{R}$ et des applications $f : E \rightarrow E$.

a) L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 0$ est linéaire.

b) L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 1$ n'est pas linéaire.

En effet, $f(0) = 1 \neq 0$.

c) L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 3x$ est une application linéaire.

En effet, $f(0) = 1 \neq 0$.

d) L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 3x + 2$ n'est pas linéaire.
En effet, $f(0) = 2 \neq 0$.

III. Application linéaires

III.1. Définition

Définition

Soient E et F deux espaces vectoriels.

- Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **linéaire** si :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2, & f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in E^2, & f(\lambda \cdot \vec{x}) = \lambda \cdot f(\vec{x}) \end{array} \right.$$

(compatibilité pour les lois + et \cdot)

- L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.
- Lorsque $E = F$, on notera simplement $\mathcal{L}(E)$.

Proposition 7 (Caractérisation des applications linéaires).

Soient E et F deux espaces vectoriels.

Une application $f : E \rightarrow F$ est linéaire ssi :

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2, \quad f(\lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{y}) = \lambda \cdot f(\vec{x}) + \mu \cdot f(\vec{y})$$

On peut aussi énoncer la propriété équivalente :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2, \quad f(\lambda \cdot \vec{x} + \vec{y}) = \lambda \cdot f(\vec{x}) + f(\vec{y})$$

Démonstration.

C'est un bon exercice. La méthode est similaire à celle utilisée dans la démonstration de la proposition 2. \square

Démonstration.

2) (\supseteq) Évident.

(\subseteq) Si $\vec{u} \in \text{Vect}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m, \vec{a}_{m+1})$, alors \vec{u} s'écrit $\vec{u} = \sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i \vec{a}_i$. Or

$\vec{a}_{m+1} \in \text{Vect}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m)$ donc $\vec{a}_{m+1} = \sum_{i=1}^m \mu_i \vec{a}_i$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \vec{a}_i \right) + \lambda_{m+1} \vec{a}_{m+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \vec{a}_i \right) + \lambda_{m+1} \left(\sum_{i=1}^m \mu_i \vec{a}_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^m (\lambda_i + \lambda_{m+1} \mu_i) \vec{a}_i \end{aligned}$$

et donc $\vec{u} \in \text{Vect}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m)$. \square

II.3. Base d'un sous-espace vectoriel

Définition

Soit E un espace vectoriel.

- On dira qu'une famille $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \in E^n$ est une **base de E** si pour tout vecteur \vec{x} de E , il existe un unique n -uplet $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i$$

- Autrement dit, \vec{x} se décompose de manière unique sous forme d'une combinaison linéaire de $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$.
- Les réels (x_1, \dots, x_p) sont les **coordonnées** de \vec{x} dans la base \mathcal{B} .

Exemple

a) Si on prend $E = \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ n'est pas une base de E .

En effet, $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ne peut s'écrire sous la forme $\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

Elle est appelée base canonique de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est elle aussi une base de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ n'est pas une base de E .

En effet, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

b) Si on prend $E = \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ n'est pas une base de E .

En effet, $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ne peut s'écrire sous la forme $\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Elle est appelée base canonique de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est elle aussi une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ n'est pas une base de E .

Théorème 1.

Soit E un espace vectoriel non réduit à $\{\vec{0}_E\}$.

- Si E admet une base \mathcal{B} de cardinal fini $n \in \mathbb{N}$, alors toutes les bases de E sont finies et de cardinal n .

- Ce nombre n est appelé **dimension de l'espace vectoriel E** , noté $\dim E$.

- Par convention, on note $\dim(\vec{0}_E) = 0$.

Démonstration.

Ce n'est pas un attendu du programme de première année.

On ne développera donc pas la démonstration ici. □

Remarque

- $\dim(\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})) = 2$.
- $\dim(\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})) = 3$.
- $\dim(\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})) = 4$.

Démonstration.

(\Rightarrow) Si $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une base de E , alors elle est génératrice (c'est l'objet de la proposition 5). Il reste donc à démontrer que cette famille est libre. Supposons qu'il existe une relation de dépendance linéaire entre les \vec{e}_i ; soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ un n -uplet tel que :

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n = \vec{0}$$

On exprime ainsi $\vec{0}$ comme combinaison linéaire d'éléments de $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. La famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ étant une base de E , le vecteur $\vec{0}$ admet décomposition unique dans $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. Or $\vec{0}$ s'écrit aussi comme : $\vec{0} = 0\vec{e}_1 + \dots + 0\vec{e}_n$. On en déduit que ces deux décompositions sont identiques. Ainsi, $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ et la famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est bien libre.

(\Leftarrow) Si la famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est génératrice alors tout élément \vec{x} de E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. Il suffit donc de montrer que cette décomposition est unique. Supposons donc que $\vec{x} \in E$ admettent deux décompositions différentes :

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n \\ \vec{x} &= \beta_1 \vec{e}_1 + \dots + \beta_n \vec{e}_n \end{aligned}$$

où les λ_i et β_i sont des réels. Par soustraction, on a alors :

$$\vec{0} = (\lambda_1 - \beta_1) \vec{e}_1 + \dots + (\lambda_n - \beta_n) \vec{e}_n$$

Comme $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une famille libre on obtient que : $\lambda_1 - \beta_1 = \dots = \lambda_n - \beta_n = 0$. D'où $\lambda_i = \beta_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ce qui conclut la démonstration. \square

Interprétation graphique.

a) L'ensemble $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ « n'est rien d'autre » que \mathbb{R}^2 .

(note : on pourrait exprimer cette correspondance en termes mathématiques précis)

- Le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ peut-être vu comme le vecteur directeur de l'axe des abscisses (\vec{i}) . $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est alors la droite vectorielle dirigée par \vec{i} : c'est l'axe des abscisses.
- Le vecteur $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ peut-être vu comme le vecteur directeur de l'axe des ordonnées (\vec{j}) . $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est alors la droite vectorielle dirigée par \vec{j} : c'est l'axe des ordonnées.
- La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ constitue une base du plan (vectoriel) \mathbb{R}^2 . Tout point P de \mathbb{R}^2 s'écrit de manière unique sous la forme : $x\vec{i} + y\vec{j}$. x (abscisse) et y (ordonnée) sont les coordonnées du point P .

b) L'ensemble $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ « n'est rien d'autre » que \mathbb{R}^3 .

- Le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ peut-être vu comme le vecteur directeur de l'axe des abscisses (\vec{i}) . $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est alors la droite vectorielle dirigée par \vec{i} : c'est l'axe des abscisses.
- De même, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ et $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ sont deux plans dont l'intersection est la droite vectorielle $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.

- $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ constitue une base de l'espace \mathbb{R}^3 . Tout point P de \mathbb{R}^3 s'écrit de manière unique sous la forme : $x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$ avec x (abscisse), y (ordonnée) et z (cote), coordonnées du point P .

c) De même, \mathbb{R}^4 s'identifie à $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, espace de dimension 4.

d) Et aussi \mathbb{R}^5 espace vectoriel de dimension 5.
e) ...

Proposition 5.

Soit E un espace vectoriel.

$$\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \in E^n \text{ une base de } E \Rightarrow E = \text{Vect}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$$

Démonstration.

Comme \mathcal{B} est une base de E , tout élément \vec{x} se décompose (de manière unique) comme combinaison linéaire d'éléments de \mathcal{B} donc appartient à $\text{Vect}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. \square

Remarque

Il n'y a pas équivalence. Par exemple, si on prend $E = \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

Alors $E = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ et $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ n'est pas une base de E .

Définition

Soit E un espace vectoriel.

Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une famille de vecteurs de E .

- La famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est dite **génératrice** si :

$$E = \text{Vect}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$$

Autrement dit, si tout vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de la famille.

- La famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est dite **libre** si :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n, \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{e}_i = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 \right)$$

On dira aussi que les vecteurs $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ sont **linéairement indépendants** : aucun des \vec{e}_i ne peut s'exprimer comme combinaison linéaire (non triviale) des autres vecteurs.

Proposition 6.

Soit E un espace vectoriel.

$$\begin{array}{l} \text{La famille } (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \text{ de } E \\ \text{est une base de } E \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{1) C'est une famille génératrice.} \\ \text{2) C'est une famille libre.} \end{array}$$