

Feuille d'exercices n°4 : Intégration

Techniques de calcul d'intégrales

Exercice 1

Calculer les intégrales suivantes :

$$a) \int_0^2 t e^{2t} dt$$

$$d) \int_1^4 \sqrt{x} \ln(x) dx$$

$$b) \int_1^e \ln(x) dx$$

$$e) \int_0^1 \frac{t}{2t+1} dt$$

$$c) \int_2^4 \frac{1}{1-x^2} dx$$

$$f) \int_0^1 x \sqrt{3x+1} dx$$

Exercice 2

Soit g la fonction définie sur \mathbb{R}_+ par $g(x) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - \frac{\ln(1+x)}{x}$.

A l'aide d'un changement de variables, montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$:

$$\int_0^x e^{-t} \ln(1+e^t) dt = g(e^x) + 2 \ln(2)$$

Exercice 3

Déterminer la nature des intégrales suivantes, et donner leur valeur en cas de convergence.

$$1. \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt \quad 2. \int_1^2 \frac{x}{(x-1)^{\frac{1}{3}}} dx \quad 3. \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$$

$$4. I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx \quad \text{puis} \quad J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx.$$

Exercice 4

Soit x un réel strictement positif et n un entier naturel non nul.

$$1. \text{ Étudier la convergence de l'intégrale } I_n(x) = \int_{-\ln(x)}^{+\infty} e^{-nt} dt.$$

$$2. \text{ Étudier suivant les valeurs de } x, \text{ la convergence de la série de terme général } I_n(x).$$

$$3. \text{ On pose } J_n(x) = \int_{-\ln(x)}^{+\infty} e^{-t} \frac{1 - e^{-nt}}{1 - e^{-t}} dt.$$

a) Justifier la convergence de l'intégrale $J_n(x)$.

On distinguera les cas $0 < x < 1$ et $x > 1$.

b) Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} = J_n(x)$.

4. On suppose ici que $0 < x < 1$.

a) Étudier la fonction g définie sur $[-\ln(x), +\infty[$ par $g(t) = \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}}$.

b) Calculer $\int_{-\ln(x)}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}} dt$ et en déduire la valeur de $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k}$.

Changement de variable affine

Exercice 5

Pour tout couple d'entiers naturels (p, q) , on pose $B(p, q) = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt$.

1. Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. Montrer que : $B(p, q) = B(q, p)$.

2. Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$. Établir la relation : $B(p, q) = \frac{p}{q+1} B(p-1, q+1)$.

3. Calculer, pour tout entier naturel n , $B(0, n)$.

4. En déduire la valeur de $B(p, q)$, pour tout couple d'entiers naturels (p, q) .

5. En déduire une expression simple de $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{1}{p+k+1}$, pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^2$.

Exercice 6

Soient a et b deux réels strictement positifs et $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+)$ telle que l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt \text{ converge.}$$

1. Montrer que, pour $\alpha > 0$, on a :
$$\int_{\alpha}^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = \int_{b\alpha}^{a\alpha} \frac{f(t)}{t} dt.$$

2. En déduire que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx$ existe et vaut $f(0) \ln\left(\frac{a}{b}\right)$.

3. Montrer l'existence $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-bx} - e^{-ax}}{x} dx$ et donner sa valeur.

4. Déduire de la question précédente la convergence et la valeur de $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln(t)} dt$.

Intégrale fonction de ses bornes**Exercice 7**

On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$.

1. a) Démontrer que f est définie sur $]0, +\infty[$.
Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$, et calculer f' .

b) En déduire $f(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.

2. Retrouver ce résultat en posant le changement de variable $u = \frac{1}{t}$.

Exercice 8

On considère la fonction H définie sur \mathbb{R}_+ par $H(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t} dt$.

1. Montrer que H est bien définie sur \mathbb{R}_+ .

2. Montrer que H est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+ , et calculer $H'(x)$, pour tout $x \geq 0$.

3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} xH(x) = 0$.

4. Montrer que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} H(t) dt$ est convergente et calculer sa valeur en fonction de $H(0)$.

Sommes de Riemann**Exercice 9**

Calculer les limites des suites dont on donne le terme général ci-dessous.

1. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^3}{n^4}$

4. $z_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2n+k)(\ln(2n+k) - \ln(n))}$

2. $v_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2}{n^3 + k^3}$

5. $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n(n+k)}}$

3. $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$

6. $t_n = \left(\frac{(2n)!}{n^n n!}\right)^{\frac{1}{n}}$

Exercice 10

Étudions l'erreur commise lorsque l'on approche une intégrale par une somme de Riemann.

On considère la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.

1. Justifier l'existence d'un réel M tel que $\forall x \in [0, 1], |f'(x)| \leq M$.
Déterminer un tel réel M .

2. Montrer que pour tout entier naturel n non nul :

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(t) dt \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(t) \right| dt$$

3. En déduire que pour tout entier naturel n non nul :

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(t) dt \right| \leq \frac{1}{n}$$

4. Écrire, en **Scilab**, un programme qui calcule et affiche une valeur approchée de $\int_0^1 f(t) dt$ à **epsilon** près, le réel **epsilon** étant entré au clavier par l'utilisateur.

Intégrales définies par une relation de récurrence

Exercice 11

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx$.

1. Montrer que I_n existe, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
3. **a)** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$.
b) En déduire l'existence et la nature de la série de terme général $v_n = \ln(I_n) - \ln(I_{n-1})$, puis la limite de $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \sqrt{n} I_n$ et $K_n = \sqrt{n+1} I_n$.
a) Montrer que les suites $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.
b) En déduire qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\alpha}{\sqrt{n}}$.
5. **a)** Calculer I_n en fonction de n .
b) On admet la formule de Stirling : $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$.

Montrer que : $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^{2n+1} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{n}}$.

- c)** Déterminer la valeur de α .

Exercice 12

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose : $J_n = \int_0^{+\infty} e^{-u} u^n du$ et $I_n = \int_0^1 (t \ln(t))^n dt$.

1. Montrer que J_0 est convergente, et calculer sa valeur.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale J_n existe.
À l'aide d'une relation de récurrence entre J_n et J_{n+1} , déterminer la valeur de J_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale I_n est convergente.
4. Soit $x \in]0, 1[$. En posant $u = -(n+1) \ln(t)$, calculer $\int_x^1 (t \ln(t))^n dt$.
5. En déduire la valeur de $I_n = \int_0^1 (t \ln(t))^n dt$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 13

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ et $u_n = \sqrt{n} I_n$.

On admet que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que I_n est convergente.
Établir une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone et étudier sa convergence.
3. Calculer I_n , pour tout $n \geq 1$.
4. **a)** Montrer que, pour tout réel x : $\ln(1+x^2) \leq x^2$.
En déduire que pour tout $n \geq 1$: $I_n \geq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nx^2} dx$.
b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{n}}$.
c) En déduire une minoration de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et conclure que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.
5. Montrer qu'il existe un réel α tel que $\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\alpha 4^n}{\sqrt{n}}$.

Lien séries intégrales

Exercice 14

Soit f la fonction définie sur $[2, +\infty[$ par : $f(t) = \frac{1}{t \ln^2(t)}$.

1. Quelle est la nature de l'intégrale $\int_2^{+\infty} f(t) dt$?
2. Déterminer le tableau de variations de f .
3. En déduire la nature de la série $\sum \frac{1}{n \ln^2(n)}$.
4. Généraliser ce résultat en déterminant la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln^\beta(n)}$
où $\beta > 1$.

Exercice 15

On note f la fonction définie, pour tout $x > 0$, par : $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$.

1. a) Pour tout $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_n^{+\infty} f(x) dx$. Montrer que l'intégrale I_n est convergente et exprimer I_n en fonction de n .

b) En déduire que $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

2. Montrer que la série de terme général $u_n = f(n)$ est convergente.

3. a) Établir que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$.

b) En sommant soigneusement cette dernière inégalité, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq I_n \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k + \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2}$$

c) Déduire des questions précédentes un équivalent simple, lorsque n est

au voisinage de $+\infty$, de $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{k}}}{k^2}$.

Critères de comparaison (fonctions continues positives)**Exercice 16**

On considère, pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n définie sur \mathbb{R}_+^* par :

$$\forall x > 0, \quad f_n(x) = \frac{n \ln(x)}{n+1+nx^2}$$

On définit également sur \mathbb{R}_+^* la fonction h par :

$$\forall x > 0, \quad h(x) = \frac{\ln(x)}{1+x^2}$$

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel non nul.

1. Montrer que f_n et h sont continues sur \mathbb{R}_+^* et étudier leur signe.

2. a) Montrer que l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$ est convergente et déterminer sa valeur.

b) Montrer que l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} h(x) dx$ est convergente.

Dans toute la suite de l'exercice, on note K l'intégrale impropre :

$$K = \int_1^{+\infty} h(x) dx$$

3. a) Montrer que l'intégrale $\int_0^1 h(x) dx$ est convergente.

b) En posant $u = \frac{1}{x}$, montrer que : $K = -\int_0^1 h(u) du$.

c) En déduire que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} |h(x)| dx$ converge et est égale à $2K$.

d) En déduire également que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} h(x) dx$ converge et vaut 0.

4. a) Montrer que, pour tout réel x strictement positif : $|f_n(x)| \leq |h(x)|$.

En déduire la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.

b) Montrer que, pour tout $x > 0$: $h(x) - f_n(x) = \frac{h(x)}{n+1+nx^2}$.

c) En déduire successivement : $0 \leq \int_1^{+\infty} (h(x) - f_n(x)) dx \leq \frac{K}{n+1}$,

et : $-\frac{K}{n+1} \leq \int_0^1 (h(x) - f_n(x)) dx \leq 0$.

d) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 0$.

5. Calculer, pour tout $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

A-t-on $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx$?

Exercice 17

1. Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{x}{e^x - 1} \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

\mathcal{C} désigne la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

- Montrer que f est continue et dérivable sur \mathbb{R} .
 - Étudier les variations de f et déterminer ses limites en $+\infty$ et $-\infty$.
Tracer la courbe \mathcal{C} .
 - Montrer que pour tout $x \geq 0$, on a : $0 \leq f(x) \leq 1$.
2. Montrer que l'aire comprise entre la courbe \mathcal{C} et ses asymptotes est finie.
3. Pour tout entier naturel n , on pose : $I_n = \int_0^{+\infty} f(x)e^{-nx} dx$.
- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale I_n est convergente.
 - Montrer que pour $n \geq 1$, on a : $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
 - Montrer que pour $n \geq 1$, on a : $\forall x \geq 0, f(x) = f(x)e^{-nx} + \sum_{k=1}^n x e^{-kx}$.

En déduire que : $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \int_0^{+\infty} f(x) dx$.

4. On pose pour tout $u > 0$, $J_u = \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{ux} - 1} dx$ et $K_u = \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{ux} + 1} dx$.
- Montrer que, pour tout $u > 0$, les intégrales J_u et K_u sont convergentes.
 - Calculer, pour tout $u > 0$, J_u et K_u en fonction de J_1 et K_1 .
 - Etablir que $J_1 - K_1 = 2J_2$.
 - Déduire des questions précédentes une relation simple entre J_1 et K_1 , puis entre J_u et K_u .

Exercice 18

1. Déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes :

- $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t} dt$
- $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$
(avec $n \in \mathbb{N}$)
- $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$
- $\int_1^3 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x-1}} dx$
- $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x+e^{-x}} dx$
- $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t+t^n} dt$
(avec $n \in \mathbb{N}$)
- $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} (1-e^{-t})^n dt$
(avec $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha > 0$)
- $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^n} dt$
(avec $n \in \mathbb{N}$)
- $\int_0^{+\infty} \frac{t^k e^{-xt}}{1+t^2} dt$
(avec $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $k \in \mathbb{N}$)

2. Déterminer un équivalent de $\frac{x^3 e^x}{(1+e^x)^2}$ lorsque x tend vers $+\infty$.
En déduire la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx$.

Intégrales à paramètre (avant d'avoir traité le chapitre)**Exercice 19**

Pour $x > 0$, on pose $f(x) = \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt$.

- Vérifier que pour $x > 0$, $f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x+1}$.
- Donner le sens de variation de f .
(indication : pour tout $0 < a < b$, montrer que $f(b) < f(a)$)
- En utilisant la question 1, déterminer la limite de f en $+\infty$.
- Démontrer que : $\forall x > 0, f(x) + f(x+1) \leq 2 f(x)$.
 - Démontrer que : $\forall x > 0, f(x) + f(x+1) \geq 2 f(x+1)$.
 - En déduire un équivalent simple de f en $+\infty$.

Exercice 20**Étude de la fonction Γ**

On rappelle que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ est convergente et :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$$

1. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ est convergente, et calculer sa valeur.

2. a) Déterminer, pour tout réel x , la valeur de $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{x+1} e^{-t}$.

b) En déduire la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$, pour tout réel x .

c) Déterminer les valeurs du réel x pour lesquelles l'intégrale $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$ est convergente.

d) En déduire que la fonction Gamma d'Euler :

$$\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

est définie sur $]0, +\infty[$.

3. a) Calculer $\Gamma(1)$.

b) Etablir une relation entre $\Gamma(x)$ et $\Gamma(x+1)$, pour tout réel strictement positif x . En déduire la valeur de $\Gamma(n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

c) Démontrer : $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du$.

En déduire : $\forall p \in \mathbb{N}, \Gamma\left(\frac{2p+1}{2}\right) = \frac{(2p)!}{2^{2p} p!} \sqrt{\pi}$.

Exercice 21

Soit f la fonction définie par $f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{t^{-x}}{1+t} dt$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .

2. Quel est le sens de variation de f ?

3. Soient a, b deux réels tels que $0 < a \leq b$, montrer que :

$$0 \leq f(a) - f(b) \leq \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

En déduire que f est continue.

4. Déterminer $f(x) + f(x+1)$ pour $x > 0$.

En déduire la limite de f en 0 et en $+\infty$.

Exercice 22

Soit f la fonction $x \mapsto \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x(1+t)} dt$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .

2. Montrer que f est monotone.

3. Montrer que $f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$.

4. a) En utilisant les questions 2 et 3, déterminer la limite de f en 0.

b) Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

(on pourra démontrer que : $\forall x > 0, f(x) + f(x+1) \leq 2f(x)$
et $f(x) + f(x+1) \geq 2f(x+1)$)

5. Calculer $f(1)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Exprimer $f(n+1)$ et $f\left(n + \frac{1}{2}\right)$ en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

6. En déduire que les séries $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ et $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$ sont convergentes et calculer leur somme respective.

Exercice 23

On pose, quand l'intégrale converge, $f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t+t^{x+1}}$.

1. Montrer que le domaine de définition de f est $]0, +\infty[$.
2. Montrer que f est décroissante sur $]0, +\infty[$.
3. **a)** Pour $x > 0$, justifier l'existence de $g(x) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(1+t^x)}$.
b) Pour $x > 0$ et $t \geq 1$, simplifier $\frac{1}{t} - \frac{t^{x-1}}{1+t^x}$, puis calculer $g(x)$.
c) En déduire que, pour tout $x > 0$: $0 \leq f(x) \leq \frac{\ln(2)}{x}$.
 Déterminer la limite de f en $+\infty$.
4. **a)** Montrer que : $\forall x > 0, 0 \leq \frac{\ln(2)}{x} - f(x) \leq \frac{1}{2x+1}$.
b) En déduire la limite et un équivalent de $f(x)$ quand x tend vers 0 .

Autre**Exercice 24**

Soit f définie par : $f(t) = \frac{t^2 - 1}{(1+t^2)\sqrt{1+t^4}}$. On pose $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

1. Montrer la convergence de $I = \int_0^{+\infty} f(t) dt$.
 Calculer I à l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$.
2. Montrer que, pour tout $x > 0$, $F(x) = F\left(\frac{1}{x}\right)$.
 En déduire qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et une fonction ε tels que :

$$\forall x > 0, F(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^3} + \frac{1}{x^3}\varepsilon(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0$$
 On précisera les valeurs de a et b .
3. Montrer que $G(x) = \ln(x) + \int_1^x F(t) dt$ possède une limite finie en $+\infty$.

Intégrale faussement impropre**Exercice 25**

On pose $I = \int_0^1 \frac{x \ln(x)}{1-x} dx$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n \ln(x)}{1-x} dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 x^n \ln(x) dx$$

1. Montrer que l'intégrale I est convergente.
2. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, que l'intégrale I_n est convergente.
3. Montrer que, pour tout $x \in]0, 1[$, $-1 \leq \frac{x \ln(x)}{1-x} \leq 0$. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-\frac{1}{n} \leq I_n \leq 0$, puis la limite de I_n , lorsque n tend vers $+\infty$.
4. Montrer que l'intégrale J_n est convergente pour tout $n \in \mathbb{N}$, et calculer sa valeur.
5. Calculer $\sum_{k=1}^n J_k$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, I = -\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k^2} + I_{n+1}$.

Énoncés de concours**Exercice 26 (E3A 2021)**

Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $I_n = \int_1^{+\infty} \exp(-t^n) dt$.

1. Justifier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'existence de I_n .
2. (*Question modifiée en attendant d'avoir accès au théorème de convergence dominée*)
a) Démontrer : $\forall u \in \mathbb{R}_+, (1+u)^n \geq 1+n u$.
b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \int_1^{+\infty} \exp(-1-n(t-1)) dt$.
c) En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. En le justifiant, effectuer le changement de variable $u = t^n$ dans I_n .

Exercice 27 (CCINP 2022)**Partie I – Convergence d’une suite**

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Pour tout $k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$, on pose : $a_{k,n} = \frac{\sqrt{2n}}{2^{2n+1}} \binom{2n}{k}$.

Pour tout $m \in \mathbb{N}$, on pose : $I_m = \int_0^1 (1-t^2)^{\frac{m}{2}} dt$.

1. Montrer que la suite $(I_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
2. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$: $I_{m+2} = \frac{m+2}{m+3} I_m$.
3. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$I_{2n} = \frac{\sqrt{2n}}{2(2n+1)a_{n,n}}, \quad \text{et} \quad I_{2n-1} = \frac{\pi}{\sqrt{2n}} a_{n,n}$$

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 \leq \frac{I_{2n-1}}{I_{2n}} \leq \frac{I_{2n-2}}{I_{2n}}$.

En déduire : $\frac{1}{1 + \frac{1}{2n}} \leq 2\pi (a_{n,n})^2 \leq 1$.

5. En déduire la convergence de la suite $(a_{n,n})_{n \geq 1}$ puis :

$$I_{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$$

Partie II – Calcul d’une intégrale de Gauss

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $J_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on pose :

$$u_n(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n & \text{si } 0 \leq t \leq \sqrt{n} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Enfin, on considère l’intégrale de Gauss :

$$K = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$$

6. À l’aide d’un changement de variable simple, déduire de la 5 que la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et donner sa limite.
7. Montrer que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur \mathbb{R}_+ et donner sa limite.
(Autrement dit, on cherche, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, la limite de la suite $(u_n(t))_{n \in \mathbb{N}^*}$)
8. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $1 + x \leq e^x$.
En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\forall t \in \mathbb{R}_+, 0 \leq u_n(t) \leq e^{-t^2}$.
9. Montrer que l’intégrale K est convergente, puis déduire des questions précédentes une valeur exacte de K .
(On pourra admettre : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} u_n(t) dt = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(t) \right) dt$)

Exercice 28 (CCINP 2021)

Dans toute cette partie, on suppose que $\alpha \in]0, 1[$.

L’objectif est de donner un équivalent de $f_\alpha(x)$ quand x tend vers 1.

Pour tout $x \in]0, 1[$, on considère l’intégrale : $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt$.

1. Justifier que, pour tout $x \in]0, 1[$, l’intégrale $I(x)$ est convergente.
2. On rappelle que la fonction Γ d’Euler est définie sur \mathbb{R}_+^* par :

$$\forall s \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$$

Pour tout $x \in]0, 1[$, déterminer une expression de $I(x)$ faisant intervenir $\ln(x)$, α et $\Gamma(1-\alpha)$.

3. Prouver que, pour tout $x \in]0, 1[$, la fonction $t \mapsto \frac{x^t}{t^\alpha}$ définie pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ est décroissante sur \mathbb{R}_+^* .
4. En déduire, pour tout $x \in]0, 1[$, l’encadrement :

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt \leq f_\alpha(x) \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt$$

5. En déduire un équivalent de $f_\alpha(x)$ quand x tend vers 1.

Exercice 29 (CCINP 2020)

Pour $x > 0$, on note : $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-tx} dt$,

$$G(x) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \sin(t) dt \quad \text{et} \quad H(x) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \cos(t) dt$$

1. Montrer que : $\forall t \in \mathbb{R}_+, |\sin(t)| \leq t$.
2. Montrer que les fonctions F , G et H sont bien définies sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$.
4. Montrer que F est de classe \mathcal{C}^1 sur $]0, +\infty[$ et exprimer F' à l'aide de la fonction G .
(Question admise à ce stade de l'année. On pourra utiliser dans la suite : $\forall x > 0, F'(x) = -G(x)$)
5. Trouver une expression simple pour G et pour H .
(On pourra calculer $H(x) + iG(x)$)

En déduire, pour $\alpha \in]0, +\infty[$, la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-tx} \cos(\alpha t) dt$.

6. En déduire une expression simple pour F . Que vaut $F(1)$?

Exercice 30 (CCINP 2019)

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t(1-itx)} dt.$$

1. Montrer que la fonction f est bien définie sur \mathbb{R} .
Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note $\Gamma_p = \int_0^{+\infty} t^p e^{-t} dt$.
2. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de Γ_p et déterminer une relation entre Γ_{p+1} et Γ_p .
3. En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la valeur de Γ_p .

Exercice 31 (E3A 2020)

Soient a un réel strictement positif et f une fonction continue sur \mathbb{R} .

Pour tout λ réel, on pose $I(\lambda) = \int_a^{+\infty} \frac{\lambda - f(t)}{t} dt$, lorsque cela existe.

1. **Dans cette question, et uniquement cette question**, f est la fonction $t \mapsto \cos\left(\frac{t}{1+t^2}\right)$.
 - a) En utilisant un développement asymptotique de f au voisinage de $+\infty$, donner un équivalent de $\lambda - f(t)$ lorsque t tend vers l'infini.
 - b) En déduire l'ensemble des valeurs du réel λ pour lesquelles $I(\lambda)$ existe.
 - c) Donner alors un équivalent de $\int_a^x \frac{f(t)}{t} dt$ lorsque x tend vers l'infini.
2. On suppose qu'il existe λ et μ deux réels pour lesquels $I(\lambda)$ et $I(\mu)$ existent. Prouver que l'on a : $\lambda = \mu$.
3. Pour tout x réel, on pose $H_\lambda(x) = \int_a^x (\lambda - f(t)) dt$.
 - a) Justifier que H_λ est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et préciser $H'_\lambda(x)$.
 - b) Démontrer que si H_λ est bornée sur \mathbb{R} , alors $I(\lambda)$ existe et :

$$I(\lambda) = \int_a^{+\infty} \frac{H_\lambda(t)}{t^2} dt$$

4. Désormais on suppose que f est continue sur \mathbb{R} et T -périodique ($T > 0$).
 - a) Démontrer que la fonction $\varphi : x \mapsto \int_x^{x+T} f(t) dt$ est constante.
Montrer alors que l'on a, pour tout réel x :
$$H_\lambda(x+T) - H_\lambda(x) = \lambda T - \int_0^T f(t) dt$$
 - b) Montrer qu'il existe une unique valeur λ_0 du réel λ pour laquelle la suite $(H_\lambda(a + nT))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
 - c) Prouver que, dans ce cas, la fonction H_λ est périodique et bornée dans \mathbb{R} .

d) Déterminer alors toutes les valeurs du réel λ pour lesquelles $I(\lambda)$ converge.

e) Dans le cas où $\lambda_0 \neq 0$, déterminer un équivalent de $\int_a^x \frac{f(t)}{t} dt$ lorsque x tend vers l'infini.

5. Pour tout entier naturel n non nul, on pose :

$$A_n = \int_0^{\pi/2} \frac{|\sin(nt)|}{\sin(t)} dt \quad \text{et} \quad B_n = \int_0^{\pi/2} \frac{|\sin(nt)|}{t} dt$$

a) Prouver que A_n existe. On admettra qu'il en est de même pour B_n .

b) Déterminer un équivalent au voisinage de 0 de la fonction :

$$t \mapsto \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin(t)}$$

c) Démontrer que la suite $(A_n - B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée.

d) On effectue dans B_n le changement de variable $u = nt$.

(i) Donner un équivalent de B_n lorsque n tend vers l'infini.

On pourra utiliser les résultats établis à la question 4.

(ii) En déduire un équivalent de A_n lorsque n tend vers l'infini.